

大兴安岭二新变种^{*}

张 悦¹ 马俊莹²

(1. 黑龙江省科学院自然资源研究所, 哈尔滨 150040)

(2. 大兴安岭地区森林调查规划设计院, 加格达奇 165000)

摘 要 发表了采自大兴安岭的二新变种, 即黄草苳蓉(*Boschniakia rossica* var. *flavida* Y. Zhang et J. Y. Ma.) 和白花柳兰(*Chamaenerion angustifolium* var. *albium* Y. Zhang et J. Y. Ma.)

关键词 黄草苳蓉; 白花柳兰

TWO NEW VARIETIES FROM DAXING' ANLING

ZHANG Yue¹ MA Jun-Ying²

(1. Nature Resources Institute of Heilongjiang Academy of Science, Harbin 150040)

(2. Institute of Forest Survey and Planning in the Daxing' anling region, Jiagedaqi 165000)

Abstract Two varieties collected from Daxing' anling: *Boschniakia rossica* var. *flavida* Y. Zhang et J. Y. Ma. and *Chamaenerion angustifolium* var. *albium* Y. Zhang et J. Y. Ma.

Key words *Boschniakia rossica* var. *flavida*; *Chamaenerion angustifolium* var. *albium*.

1 黄色草苳蓉 新变种

Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch var. *flavida* Y. Zhang et J. Y. Ma, var. nov. Differt a typo planta flavus et semi-hyalinus Hab. Intramongol, Daxing' anling, Ma No, 321 (Typus)

与原种主要区别为植株呈黄色半透明状。产地内蒙古, 大兴安岭(南瓮河自然保护区), 马俊莹等。321 号(模式标本存黑龙江省科学院自然资源研究所标本室)。

此变种零星分布于毛赤杨(*Alnus sibirica*)林下, 伴生植物有小叶章(*Calamagrostis angustifolia*)、舞鹤草(*Maianthemum bifolium*)、苔草

(*Carex* spp.)、欧亚绣线菊(*Spiraea media schmidt*)等。

2 白花柳兰

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. var. *albium* Y. Zhang et J. Y. Ma, var. nov. Differt atypo perianthis albis. Hab. Heilongjiang, Daxing' anling, Ma No330 (Typus)

与原种主要区别为花被为白色。产地黑龙江省大兴安岭(盘古), 马俊莹等 330(模式标本存黑龙江省科学院自然资源研究所标本室)。

此变种发现于塔河林业局盘古林场三直线的林缘路旁成小片分布, 其花苞片为淡紫红色, 其它部分为纯白色; 蒴果圆柱形, 淡黄绿色。

* 第一作者简介: 张悦(1962—), 男, 副研究员, 主要从事植物资源研究。

收稿日期: 2003—07—06