

本种与长穗苔草 *C. longispiculata* Y. C. Yang 相近, 不同在于雌花鳞片宽卵形, 长 1.8~2 mm, 宽 1.5~3 mm 而易于区别。

5 昌宁苔草 新变种

Carex melinacra Franch. var. *changningensis* S. Y. Liang, var. nov.

A var. *melinacra* differt spiculis atro-brunneis, ima remota, pedunculo elongato, gracili, 5~11 cm longo, squamis pistillatis utriculis brevioribus.

Yunnan(云南): Changning(昌宁), stream side, alt. 3000 m, 1938-06-10, T. T. Yu (俞德浚)16205(holotype, PE).

与原变种的区别在于小穗暗褐色, 最下部的 1 个小穗远离, 其柄纤细, 长 5~11 cm。雌花鳞片短于果囊。

秋海棠属一新名称

A new name of the genus *Begonia* L.

Begonia sinobrevicaulis Ku, nom. nov. — *B. brevicaulis* Ku in Acta Phytotax. Sin. 35(1): 53, fig. 31. 1997, non A. DC. 1859.

谷粹芝(中国科学院植物研究所, 北京 100093)

KU Tsue-Chih (Institute of Botany, the Chinese Academy of Science, Beijing 100093)