

贵州异叶苣苔属一新种*

王印政** 李振宇

(中国科学院植物研究所系统与进化植物学开放研究实验室, 北京 100093)

A NEW SPECIES OF THE GENUS *WHYTOCKIA* W. W. SMITH (GESNERIACEAE) FROM GUIZHOU, CHINA

Wang Yin-zheng Li Zhen-yu

(Laboratory of Systematic & Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093)

Key words *Whytockia*; *W. bijieensis*; Guizhou

关键词 异叶苣苔属; 毕节异叶苣苔; 贵州

毕节异叶苣苔 新种 图 1

Whytockia bijieensis Y. Z. Wang et Z. Y. Li, sp. nov.

Affinis *W. chiritiflorae* (Oliv.) W. W. Smith, a qua foliis angustioribus et longioribus, sepalis basi tantum connatis, capsula irregulariter et imperfecte dehiscente, parte inferiore cupuliformi persistente differt.

Herba perennis. Caules succulenti, 20~50 cm alti, saepe simplices, 5~7-nodes, inferne glabrescentes, superne brunneolo-pubescentes et glandulosi. Folia opposita, per paria valde inaequalia; ea normalia breviter petiolata vel subsessilia; lamina membranacea, anguste ovata vel anguste ovato-oblonga, 6~15 cm longa, 2~4 cm lata, apice acuminata, basi in latere angusto cuneata, in latere lato rotundata vel auriculata, margine irregulariter remote repando-serrata et glandulosa, utrinque sparse pubescens, nervis lateralibus in latere lato 8~12 in latere angusto 4~6; petioli 1~2 mm longi, inferiores ad 4 mm longi; ea redacta sessilia vel subsessilia, late ovata vel ovata, 0.6~2.1 cm longa, Cymae axillares vel subterminales, 4~8 cm longae, 2~6-florae; pedunculi 2~6 cm longi, cum pedicellis pubescentes et glandulosi; pedicelli 1.0~2.1 cm longi, post anthesin apice incrassati. Calyx 3~4 mm longus, campanulatus; sepalia 5, libera, basi tantum connata, ovata vel ovato-triangularia, 3~3.5 mm longa, 2 mm lata, apice obtusa vel acuta, extus puberula, intus glabra. Corolla

* 本项工作得到中国科学院院长基金资助。

本文承蒙王文采研究员、吴征镒研究员、A. Weber 教授和 Laurence E. Skog 博士审阅和修改, 张泰利、王凌女士绘图, 特此致谢。

* 现在地址: 中国科学院昆明植物研究所, 昆明 650204。

1996-10-21 收稿。




图1 毕节异叶苣苔 1. 花枝; 2. 花萼; 3. 花冠剖开; 4. 雄蕊; 5. 花盘和雌蕊; 6. 宿存花萼和不规则开裂的成熟蒴果; 7. 果实开裂后宿存的杯状果壳

Fig. 1 *Whytockia bijieensis* 1. flowering shoot; 2. calyx; 3. corolla opened; 4. stamens; 5. disc and pistil; 6. persistent calyx and irregular dehiscence of mature capsule; 7. persistent cup-shaped shell of fruit after dehiscence.

rubella, 1.7~2.0 cm longa, extus glabra, intus infra faucem inter lobos anticos pilis bifariis aurantiaco-rubris claviformibuds tecta, tubo circ. 1 mm longo, labio postico 3 mm longo ad medium 2-fido, lobis semiorbicularibus, labio antico circ. 5~6 mm longo 3-partito, lobis o-

vatis. Stamina 4, filamentis 2 mm supra basin corollae insertis superne incrassatis ciliatis, anticis 6 mm longis prope medium geniculatis, posticis circ. 4 mm longis, antheris 1.1 mm latis pubescentibus. Staminiodium longe ovatum, circ. 1.1 mm longum. Discus circ. 0.4 mm altus. Pistillum circ. 8 mm longum, ovario ovoideo circ. 1.6 mm longo, stylo circ. 4.8 mm longo ovario ultra 2.5-plo longiore, stigmatibus 2 liberis. Capsula depresso globosa, 4 mm longa, 6 mm diam., glabra, irregulariter et imperfecte dehiscente, inferne cupuliformis, cum calyce persistens.

Guizhou(贵州): Bijie(毕节), Shengji(生机), alt. 1500 m, by stream, in shady and moist places, 1994-10-01, Y. Z. Wang (王印政) 94002 (holotype! PE); same locality, 1995-09-12, Y. Z. Wang 95001 (KUN).

多年生草本。茎肉质,高20~50 cm,常不分枝,具5~7节,下部无毛,上部被褐色短柔毛和短腺毛。叶对生,极不等大;正常叶有短柄或近无柄,叶膜质,狭卵形或狭卵状长圆形,长6~15 cm,宽2~4 cm,顶端渐尖,基部在宽侧圆形或耳形,在狭侧楔形,边缘有稀疏的钝锯齿和腺体,叶两面疏被柔毛。侧脉在宽侧8~12条,在狭侧4~6条,叶柄长1~2 mm,茎下部有时可达4 mm,退化叶无柄或近无柄,宽卵形至卵形,长0.6~2.1 cm。聚伞花序腋生或顶生,长4~8 cm,具2~6朵花;花序梗长2~6 cm,花梗长1.0~2.1 cm,花后先端增粗,两者均被短柔毛和腺毛,花萼长3~4 mm,萼片5,仅基部合生,外面疏被短柔毛和腺毛,内面无毛,裂片卵形或卵状三角形,长3~3.5 mm,宽2 mm,顶端钝或锐尖。花冠粉红色,长1.7~2.0 cm,外面无毛,内面在下唇裂片之间的喉部以下有2列橙红色单细胞囊状毛,上唇长3 mm,2裂至中部,裂片半圆形,下唇长约6 mm,3深裂,卵形。能育雄蕊4,着生于距花冠基部2 mm处,花丝上部增粗,被短柔毛,先端具缘毛,前方花丝约6 mm,近中部膝状弯曲,后方花丝长约4 mm,花药宽1.1 mm,被柔毛;退化雄蕊长卵形,长约1.1 mm。花盘高0.4 mm。雌蕊长约8 mm;子房卵形,长约1.6 mm;花柱长约4.8 mm,超过子房的2.5倍以上;柱头2,分离。蒴果扁球形,长4 mm,直径6 mm,无毛,不规则开裂,开裂后以杯状果壳和花萼宿存在果梗上。种子椭圆球形。花期8~9月。果期9~10月。

本种和 *W. chiritiflora* (Oliv.) W. W. Smith 接近,但叶片狭长,萼片仅基部合生,蒴果不规则开裂,开裂后以杯状果壳宿存在果梗上而明显区别。